

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ		Οδηγία: EG – 005.10	
Υπεύθυνος Σύνταξης		Υπεύθυνος Έγκρισης	
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέπωντας Γεωπόνος	(υπογραφή)	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επικεφαλής	(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 25.07.2019		Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.
Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού	Όπως ορίζεται

Για την αντιμετώπιση της ανάρσιας, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 27 έως 29 Ιουλίου :

Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 1.8 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)

lambda cyhalothrin* (Saratan 2,5WG, *Karate*): 40gr/100 lt, 10cc/100 lt νερού (7 ημέρες)

deltamethrin (Decis 2,5 EC): 50cc/ 100lt νερού. (7 ημέρες)

beta cyfluthrin 2.5% (διάφορα σκευάσματα): 50-70cc /100 lt νερό (7 ημέρες)

Indoxacarb* (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ΗΜΕΡΕΣ)

Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Emamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorantraniliprole * (CORAGEN 20 SC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή

Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorpyrifos-methyl (ενδ.: Reldan 22,5 EC): 445 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ΗΜΕΡΕΣ)

Etofenprox* (THERBONAL): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και κάποιο μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών, από την οδηγία AG-005.5:

Σε σχέση με τον προηγούμενο ψεκασμό, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Σε αγροτεμάχια με ποικιλίες νεκταρινιών να προτιμηθεί το **Spinetoram 25%** (Delegate 250WG) το οποίο είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του θρίπα.

Η παρακάτω Οδηγία για την εφαρμογή εντομοκτόνων, αφορά τους παραγωγούς που δεν εφαρμόζουν την μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης Πρόσκλησης (2017) του μέτρου (3^η χρονιά εφαρμογής)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάσουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

10. ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ – ENTOMA/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: NOVACERT

PAGE 1/ NUMPAGES 1