

**ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ &
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ –
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)**

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ		Οδηγία: EGG – 013.5	
Υπεύθυνος Σύνταξης		Υπεύθυνος Έγκρισης	
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέπωντας Γεωπόνος	(υπογραφή)	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επικεφαλής	(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 16.07.2019		Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.
--	---

**ΟΛΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ &
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ –
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)**

Εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός, με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα

- **cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC):** 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)
- **cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG):** 60-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
- **boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG):** 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
- **fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC):** 37,5-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
- **Tebuconazole: (Folicur 25WG κα)** 75gr /στρ. (7 ημέρες)
- **trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG):** 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Συνιστάται επίσης και η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών.

Ο παραπάνω ψεκασμός των μυκητοκτόνων να γίνει σε συνδυασμό και με ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα, στα αγροκτήματα και στις ποικιλίες που η συγκομιδή τους πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες 2 εβδομάδες

- **lambda cyhalothrin* (Saratán 2,5WG, Karate):** 40gr/100 lt, 10cc/100 lt νερού (7 ημέρες)
- **deltamethrin (Decis 2,5 EC):** 50cc/ 100lt νερού. (7 ημέρες)
- **beta cyfluthrin 2.5%** (διάφορα σκευάσματα): 50-70cc /100 lt νερό (7 ημέρες)
- **Indoxacarb* (Steward 30 WG):** 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ΗΜΕΡΕΣ)
- **Phosmet (Imidan 50 WP):** 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
- **Emamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG):** 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
- **Chlorantraniliprole *** (CORAGEN 20 SC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή
- **Spinetoram 25%** (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
- **Etofenprox* (THERBONAL):** 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
- **Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 1.8 EC):** 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης Πρόσκλησης (2017) του μέτρου (3^η χρονιά εφαρμογής)

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασίας χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης ή ύδρευσης. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777